

Dg. Diabetes mellitus TIP 1 (novootkriveni)
Ketoacidosis
Pharyngitis acuta

PREPORUKA:

- * nastaviti inzulinoterapiju Humulin R (bistri), Humulin N (mutni), penom u sljedećim dozama koje davati u određeno vrijeme:
prije doručka B 5 ij, M 10 ij, prije ručka ako je ŠUK veći od 8 dati 2 ij B, prije večere ako je ŠUK ispod 6,0 mmol/l dati 3 ij B, ako je od 6-12 dati 4 ij B, a ako je preko 12 dati 5 ij B.
Prije spavanja 5 M, ako je ŠUK prije spavanja preko 12 mmol/l dati 2 B u stomak i 4 M u debelo meso. Poštovati razmak između doručka i ručka tačno 6 sati.
- * svakodnevna kontrola ŠUK-a 4-5x u kritičnim tačkama.
- * pridržavati se uputstva za ishranu i tjelesne aktivnosti
- * voditi dnevnik samokontrole
- * kontrola sa dnevnikom za 1 mjesec, a po potrebi i prije, a kontrola nalaza za 3 mjeseca u endokrinološkom savjetovalištu sa uputnicom uz predhodnu najavu na tel. 297-339 /sestra Sena/.
- * u slučaju problema zvati odjel 033 298 246
- * molim da se planirani okulistički pregled obavi u Goraždu (može unutar naredna 2 mjeseca).

Odjeljski ljekari:
Mr.dr S. Hasanbegović
Dr M. Mujić

Šef odjela:
Mr.dr S. Hasanbegović

27
Direktor:
Prof dr S. Mesihović- Dinarević
KLINIČKI CENTAR
UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDIJATRIJA
Odjeljenje za uobičajene i endokrine bolesti